

IPUSagro Quattro P 400

Mineralischer Kalk- und Magnesiumdünger



Dosierempfehlung

	1. Anwendung	2. Anwendung	3. Anwendung	4. Anwendung
BEEREN: Himbeere, Brombeere, Holunder, ... ACHTUNG: nicht Erdbeere	1,5 kg/ha im 2- Blattstadium	2 kg/ha 10-14 Tage nach Erstbehandlung	2 kg/ha 10-14 Tage nach Zweitbehandlung	
ERBSE, BOHNE, SENF, KICHERERBSE, LINSE, LUPINE	2,5 kg/ha ab dem 2. Blattstadium (BBCH Skala 12)	3 kg/ha ca. 14 Tage nach Erstbehandlung	3 kg/ha ca. 14-21 Tage nach Zweitbehandlung	
ERDBEERE Freigelände, Folientunnel, Glashaus	2 kg/ha bei ca. 10 cm Wuchshöhe (BBCH Skala 13-21)	2 kg/ha 14-21 Tage nach Erstbehandlung	2 kg/ha 14-21 Tage nach Zweitbehandlung	
GETREIDE Weizen, Gerste, Hafer, Roggen	2 kg/ha im 3-6 Blattstadium (BBCH Skala 13)	3,5 kg/ha ca. 14 Tage nach Erstbehandlung		
GRÜNLAND Gräser, Klee	3 kg/ha ab Vegetationsbeginn	3 kg/ha ab 3cm Neuzuwachs nach Schnitt, 2 Tage Wartezeit nach Güllebehandlung	3 kg/ha ab 3cm Neuzuwachs nach Schnitt, 2 Tage Wartezeit nach Güllebehandlung	3 kg/ha ab 3cm Neuzuwachs nach Schnitt, 2 Tage Wartezeit nach Güllebehandlung
HOPFEN	2,5 kg/ha (BBCH Skala 33)	2,5 kg/ha 20-30 Tage nach Erstbehandlung	2,5 kg/ha 20-30 Tage nach Zweitbehandlung	
KAROTTE, KNOLLESELLERIE, KOHLRABI, PETERSILIENWURZEL, RETTICH, SPARGEL, RADIESCHEN, ZWIEBEL, PORREE, SPINAT	3 kg/ha bei ca. 10 cm Wuchshöhe	3 kg/ha 10-14 Tage nach Erstbehandlung	3 kg/ha 10-14 Tage nach Zweitbehandlung	
KARTOFFEL Saat-, -Speise- & Stärkekartoffel, Speiseindustriekartoffel	Saatkartoffel: 2 kg/ha bei Austrieb erster Blätter (BBCH Skala 12-16) Industriekartoffel: 3 kg/ha nach Reihenschluss (BBCH Skala 40)	3 kg/ha ca. 14 Tage nach Erstbehandlung	3 kg/ha ca. 14-21 Tage nach Zweitbehandlung	2 kg/ha ca. 14-21 Tage nach Drittbehandlung
KERN- und STEINOBST	2 kg/ha nach Austrieb der ersten Blätter (BBCH Skala 13-16)	2 kg/ha ca. 14 Tage nach Erstbehandlung	2 kg/ha ca. 14 Tage nach Zweitbehandlung	
KÜRBISSE: Ölkürbis, Speise- und Zierkürbis	2 kg/ha bei ca. 10-15 cm Wuchshöhe	3 kg/ha ca. 14 Tage nach Erstbehandlung	2 kg/ha ca. 14 Tage nach Zweitbehandlung	

IPUSagro Quattro P 400

Mineralischer Kalk- und Magnesiumdünger



Dosierempfehlung

	1. Anwendung	2. Anwendung	3. Anwendung	4. Anwendung
MAIS	2 kg/ha bei ca. 10 cm Wuchshöhe (BBCH Skala 13-16)	3 kg/ha ca. 14 Tage nach Erstbehandlung		
PAPRIKA, TOMATE, GURKE, ZUCCHINI	2 kg/ha im 2- Blattstadium	3 kg/ha ca. 14 Tage nach Erstbehandlung	3 kg/ha ca. 14 Tage nach Zweitbehandlung	Bei Mehrfachanwendung Dosierung verringern, es soll eine Gesamt- anwendung von 8 kg/ha nicht überschritten werden
RAPS	Winterraps: Herbst: 2 kg/ha bei 1 -2 Laubblätter (BBCH Skala 11-12)/ Sommerraps: Frühjahr: 2,5 kg/ha Wuchshöhe ca. 10-15 cm (BBCH Skala 11-12)	Winterraps: Frühjahr: 2,5 kg/ha ca. 14 Tage nach Vegetationsbeginn/ Sommerraps: 2,5 kg/ha ca. 14 Tage nach Erstbehandlung	Winterraps: 3 kg/ha ca. 14 Tage nach Zweitbehandlung Sommerraps: 3 kg/ha ca. 14 Tage nach Zweitbehandlung	
RÜBEN Alle Sorten inkl. Zuckerrübe	2 kg/ha bei ca. 10 cm Wuchshöhe (BBCH Skala 13-21)	3 kg/ha ca. 14 Tage nach Erstbehandlung	3 kg/ha ca. 14-21 Tage nach Zweitbehandlung	
SALATE alle Sorten	1,5 kg/ha nach dem Setzen	2 kg/ha 10-14 Tage nach Erstbehandlung	2 kg/ha ca. 14 Tage nach Zweitbehandlung	
SONNENBLUME	1,5 kg/ha bei ca. 10 cm Wuchshöhe (BBCH Skala 13-16)	3 kg/ha ca. 14 Tage nach Erstbehandlung		
SORGHUM	2 kg/ha bei ca. 10 cm Wuchshöhe (BBCH Skala 13-16)	3 kg/ha ca. 14 Tage nach Erstbehandlung		
WEIN	1,5 kg/ha nach Austrieb der ersten Blätter	2 kg/ha nach der Blüte ca. 14-21 Tage später	2 kg/ha ca. 14-21 Tage nach Zweitbehandlung	
ZWIEBEL, KNOBLAUCH	1,5 kg/ha (BBCH Skala 13-16)	3 kg/ha ca. 14 Tage nach Erstbehandlung		